

対象疾患 **大腸がん**

レジメン名 **FOLFIRI+セツキシマブ療法**

1コースの日数 **14日**

催吐性リスク **中等度**

レジメン内容

| No | 薬品名       | 投与量   | 投与方法 | 投与ルート | 投与時間                               | 投与日 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---|------|-------|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
|    |           |   |      |       |                                    | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 生理食塩液     | 100mL   | 点滴静注 | メイン   | ルートキープ<br>フラッシュ用                   | ○   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 2  | グラニセトロン   | 3mg/100mL   | 点滴静注 | メイン   | 30分                                | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|    | デキサメタゾン   | 6.6mg   |      |       |                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|    | 生理食塩液     | 100mL   | 点滴静注 | メイン   | 30分                                |     |   |   |   |   |   |   |   | ○ |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|    | デキサメタゾン   | 6.6mg   |      |       |                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 3  | ジフェンヒドラミン | 50mg  | 経口   | 内服    | 制吐剤投与と同時に内服                        | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 生理食塩液     | 初回500mL<br>2回目以降250ml                               | 点滴静注 | メイン   | 初回120分<br>2回目以降60分<br>投与終了後60分経過観察 | ○   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|    | セツキシマブ    | 初回400mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降250mg/m <sup>2</sup> |      |       |                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 生理食塩液     | 250mL   | 点滴静注 | メイン   | 90分<br>レボホリナートと同時に開始               | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|    | イリノテカン    | 150mg/m <sup>2</sup>                                |      |       |                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 5%ブドウ糖液   | 250mL   | 点滴静注 | 側管    | 120分<br>イリノテカンと同時に開始               | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|    | レボホリナート   | 200mg/m <sup>2</sup>                                |      |       |                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 生理食塩液     | 50mL  | 急速静注 | メイン   | 全開で投与                              | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|    | 5-FU      | 400mg/m <sup>2</sup>                                |      |       |                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 生理食塩液     | 適量  | 点滴静注 | メイン   | 46時間<br>インフューザーポンプを用いて投与           | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|    | 5-FU      | 2400mg/m <sup>2</sup>                               |      |       |                                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |