

|         |                  |
|---------|------------------|
| 対象疾患    | 大腸がん             |
| レジメン名   | FOLFIRI+ベバシズマブ療法 |
| 1コースの日数 | 14日              |
| 催吐性リスク  | 中等度              |

レジメン内容

| No | 薬品名     | 投与量                   | 投与方法 | 投与ルート | 投与時間                        | 投与日 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----|---------|-----------------------|------|-------|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|    |         |                       |      |       |                             | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1  | 生理食塩液   | 100mL                 | 点滴静注 | メイン   | ルートキープ<br>フラッシュ用            | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 2  | グラニセトロン | 3mg/100mL             | 点滴静注 | メイン   | 30分                         | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|    | デキサメタゾン | 6.6mg                 |      |       |                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 3  | 生理食塩液   | 100mL                 | 点滴静注 | メイン   | 初回90分<br>2回目60分<br>3回目以降30分 | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|    | ベバシズマブ  | 5mg/kg                |      |       |                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 4  | 生理食塩液   | 250mL                 | 点滴静注 | メイン   | 90分<br>レボホリナートと同時に開始        | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|    | イリノテカン  | 150mg/m <sup>2</sup>  |      |       |                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 5  | 5%ブドウ糖液 | 250mL                 | 点滴静注 | 側管    | 120分<br>イリノテカンと同時に開始        | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|    | レボホリナート | 200mg/m <sup>2</sup>  |      |       |                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 6  | 生理食塩液   | 50mL                  | 急速静注 | メイン   | 全開で投与                       | ○   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|    | 5-FU    | 400mg/m <sup>2</sup>  |      |       |                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 7  | 生理食塩液   | 適量                    | 点滴静注 | メイン   | 46時間<br>インフューザーポンプを用いて投与    | ○   | ○ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|    | 5-FU    | 2400mg/m <sup>2</sup> |      |       |                             |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |